AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PERIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION CHAMPAGNE

(ARDENNES, AUBE, HAUTE-MARNE, MARNE)

Villa Blanche - 62. Rte Nationale - La Neuvillette, 51-REIMS - Tél. 47.22.87 47.13.82

ABONNEMENT ANNUEL: **★** F C.C.P. CHALONS-sur-MARNE 2.800.67 W

Régisseur de Recettes de la Direction Départementale de l'Agriculture à Châlons-sur-Marne

Abonnement annuel: 30 F

1973 nº 11 / 11 Mai 1973

SUPPLEMENT Nº 1 au BULLETIN nº 152 de MAI 1973

VIGNE

Rougeot parasitaire (Brenner)

Comme chaque année nous rappelons que la lutte contre ce champignon est préventive. Un traitement mettant en oeuvre les produits habituellement utilisés contre le mildiou tels que les organocupriques, le captafol, le mancozèbe, le mancopper, etc... doit être appliqué dès le stade 2-3 feuilles étalées dans les parcelles ou les régions habituellement sujettes à la maladie : vignobles nal exposés, proches des bois ou, ce qui devient rare, de vignes abandonnées, vignobles de la région de la Neuville-aux-Larris, Cuchery, Cuisles.

Pyrale:

Le prochain relèvement de température amènera une sortie de chenilles hivernantes. Intervenir alors avec des produits tels que les parathions, le gusathion, le carbaryl, l phosalone, etc... choisis en fonction des températures régnant au moment du traitement.

ARBRES FRUITIERS

Tavelures du pommier et du poirier :

Maintenir la protection des vergers; les premières taches de tavelures devant apparaître entre le 15-20 Mai.

Monilia sur cerisier :

La dernière période pluvieuse a été très favorable aux contaminations. Poursuivre la protection de toutes les variétés et plus particulièrement des variétés acides telles que les griottes, sensibles au Monilia. Dès la fin de la floraison couper les brindilles malades afin de réduire les sources de contamination.

Araignées rouges - Panonychus ulmi :

Les premières éclosions ont eu lieu le 5 mai. Il est encore trop tôt pour intervenir contre ces acariens.

P1.1.7